behind with a very short basal appendage, 5 and sutural somewhat similar to 4 but shorter, interstices of the shortened striæ rather broad and flat, there is a band of scattered punctures along the apices; the propygidium has a few scattered ocellate punctures mostly placed near the base with some fine points intermixed and on the posterior area; the pygidium is punctured very similarly but appears smooth at the apex which is semicircular in outline; the prosternum very finely not thickly punctulate, lateral stria well-marked at the coxæ, slightly sinuous, fine anteriorly and feebly divergent; the mesosternum wide, anteriorly bisinuous, marginal stria complete; the anterior tibiæ unidentate.

This species is flatter than any other known in the genus.

Hab. Falls of Samlia in the River N'Gamic (Mocquereys).

Triballus corpulentus n. sp.

T. onustus *Lew. simillimus, sed fronte haud striata; thorace stria marginali antice interrupta; meso- metasternoque lævibus.* — Long. vix 3 mill.

Roundly oval, convex, black shining; the head with a few large punctures intermixed with numerous fine points, without a frontal stria; the thorax punctured like the head, marginal stria ceasing behind the neck; the elytra punctate, punctures not differing from those of the thorax, humeral striæ complete like those of *T. agrestis* Mars., and *T. onustus* Lew; the propygidium and pygidium evenly punctured, punctuation fine and somewhat sparse; the prosternum, keel rather wide with two rather fine striæ feebly divergent anteriorly, truncate behind; the mesosternum, marginal stria fine and at the sides only, separated from the metasternum by a straight crenulate stria, all the sternal plates smooth; the antennæ brownish, club red.

This species is more circular in outline than *T. onustus* Lew. and without a frontal stria; the thoracic stria ceases behind the neck and the sternal plates are impunctate.

Hab. Falls of Samlia, Riv. N'Gamic (Mocquereys). One example.

QUELQUES COLÉOPTÈRES DU THIBET,

par L. Fairmaire.

Aurisma robusta. — Long. 19 mill. — *Oblonga, postice leviter ampliata, modice convexa, æneo-viridis, metallica, subtus cum pedibus nigra, prosterno virescente; capite antice nigricante, fronte plicatulo-rugata, utrinque impressa, clypeo fortius plicato, antennis brevibus, sat validis, prothoracis basin attingentibus,*

apicem versus paulo tenuioribus, articulo 1° crasso, apice angulato et supra puncto grosso setigero impresso, 3° sequenti paulo longiore; prothorace transverso, elytris angustiore, lateribus antice rotundatis, postice leviter sinuatis, dorso transversim subtiliter striolato, medio sat fortiter striato, basi utrinque sat late sat fortiter impresso, impressione bisulcata, sulco externo extus incrassato; elytris ovatis, ad humeros rotundatis, fortiter striatis, striis lævibus, intervallis sat convexis, obsolete tranversim cicatricosis, apice extremo fere rugosulis; subtus lævis, segmentis abdominalibus apice punctis 2 grossis impressis, ultimo obsolete plicatulo, medio apice impresso et punctis 2 grossis signato; pedibus validis, femoribus transversim strigosis, tibiis anticis intus ante apicem emarginatis et spina longa acuta armatis. — Ta-tsien-lou, Thibet (coll. Oberthur).

Ressemble à l'*A. Delavayi* Fairm., du Yunnan, mais bien plus petite, plus large, d'une coloration plus verte avec les élytres ovalaires, fortement et régulièrement striées, les côtés du corselet moins sinués vers la base et la tête bien plus rugueuse.

Emus griseosericans. — Long. 18 mill. — *Elongatus, validus, fuscus, dense sericans, capite prothoraceque rufulis, scutello subaureo, elytris albido-griseis, variantibus, abdomine nitido, plagiatim rufulo-pubescente, segmento penultimo densissime griseo-subaureo-sericante, antennis pedibusque piceolo-rufis, femoribus basi late fuscis; capite convexo, prothorace haud angustiore, antennis parum validis, apicem versus vix crassioribus, articulis 4 ultimis infuscatis, ultimo acuminato; prothorace elytris angustiore, postice angustato, angulis anticis valde obtusis, dorso valde inæquali; scutello concavo, apice obtuso; elytris subquadratis, planatis, disco medio oblique impressiusculis; abdomine lateribus sat fortiter marginato, segmentis medio bifoveolatis et ad latera minus fortiter unifoveolatis; femoribus anticis inflatis, tarsis anticis latis, brevibus, apicem versus fortiter angustatis.* — Se-pin-lou-chan, Ya Tchéou, Thibet (coll. Oberthur).

Ce bel insecte se distingue facilement par sa vestiture, les élytres étant couvertes d'une pubescence satinée serrée, d'un gris perle changeant, l'avant-dernier segment abdominal étant revêtu d'une pubescence analogue, mais faiblement dorée; les antennes ne grossissent pas vers l'extrémité, les avant derniers articles ne sont pas transversaux.

Silpha picescens. — Long. 13 mill. — *Ovata, sat depressa, dilute ferrugineo-piceola, opacula, clypeo late emarginato; prothorace elytris latiore, antice angustato, lateribus rotundato, margine postico medio late lobato, angulis posticis rotundatis, dorso subti-*

liter pubescente, medio obsolete sulcatulo, basi utrinque oblonge biimpresso, impressione externa longiore et extus magis plicata; scutello subtiliter punctato; elytris latis, apice conjunctim rotundatis, sutura et utrinque costulis 3 modice elevatis, internis post medium leviter undulatis, externa post medium abbreviata, interstitiis sat subtiliter parum profunde sat dense punctatis, angulo suturali recto; subtus cum capite, antennis pedibusque fusca, nitidula, sat dense punctulata. — Se-Pin-Lou-Chan, Thibet (coll. Oberthur).

Cette *Silpha* ressemble beaucoup à la *S. marginalis*, de l'Amérique du Nord; mais elle est plus grande, la coloration du corselet est uniforme, son bord postérieur est plus nettement lobé au milieu, la ponctuation des élytres est plus fine et les tibias postérieurs sont légèrement arqués.

Silpha thibetana. — Long. 16 mill. — S. japonicæ *valde affinis, similiter colorata, sed minor et postice minus attenuata, antennis brevioribus, prothoracis medium haud attingentibus, prothorace fere simili, sed disco late lævi, medio haud canaliculato, impressionibus medianis baseos brevibus et transversim fere confusis, scutello subtilius punctato, elytris brevioribus, ante apicem tantum angustatis, apice similiter truncatulis, dorso subtilius punctatis, costis minus elevatis, 2 primis apice fere obliteratis, spatio marginali basi breviter sulcatulo, deinde haud plicatulo; subtus subtilius punctata, ano concolore;* ♀. — Ta-tsien-lou, Thibet (coll. Oberthur).

Cet insecte rentrerait comme la *S. japonica*, dans le genre *Eusilpha* Sém. Très voisine de *S. Jacowlesi* Sém., mais plus petite, plus étroite, sans teinte bleuâtre en-dessous, avec les élytres à ponctuation plus fine, les 2 premières côtes très effacées vers l'extrémité, la partie marginale très légèrement relevée longitudinalement au milieu et l'extrémité un peu plus prolongée, un peu plus sinuée avant la troncature apicale.

Geotrypes metallescens. — Long. 12 mill. — *Ovatus, valde convexus, virescenti-æneus, nitidus; capite planiusculo, antice rotundato, punctulato et obsolete arcuatim impresso, fronte angulatim sulcata, vertice lævi, antennis fuscis, clava opaca, lamellis liberis; prothorace amplo, ante basin ampliato et elytris paulo latiore, lateribus antice recte convergentibus, margine antico fere recto, angulis anticis rotundatis sed indicatis, dorso polito, medio baseos breviter sulcato et lateribus foveola signato, parte marginali anguste punctato-rugulosa, undique marginato; scutello ogivali, medio impresso; elytris brevibus, ad humeros angulatis, parum fortiter striatis, striis vix perspicue punctu-*

latis, basi breviter profundioribus, apicem versus obliteratis, intervallis vix convexiusculis, lævibus, callo humerali sat convexo, polito, subtus lævis, pedibus sat brevibus, tibiis anticis leviter arcuatis, extus sat fortiter quadridentatis, tibiis intermediis arcuatis, sulcatis, extus triangulatis, femoribus posticis subtus ad basin sat acute bidentatis, tibiis extus triangulatis, tarsis omnibus fusco-piceis. — Siao-Lou, Thibet (coll. Oberthur).

Ressemble au *splendens*, de l'Amérique du Nord, mais bien différent par le corselet lisse, à bord postérieur droit, les angles nullement saillants, et les élytres faiblement striées.

Tæniodera fulvopilosa. — Long. 13 1/2 mill. — *Ovata, sat crassa, fusco-virens nitida, elytris rufo-piceis, basi paulo obscurioribus, utrinque post medium macula externa pallida transversim signatis, dense fulvo-pilosa, elytris sat denudatis; capite dense sat subtiliter punctato-rugosulo, marginibus elevatis, antico truncato, paulo reflexo, antennis rufo-piceis, clava elongata; prothorace tranverso, elytris valde angustiore, antice angustato, basi late arcuato, angulis fere rotundatis, dorso dense sat subtiliter punctato, basi medio late impresso; scutello acuto, leviter concavo, punctato; elytris sat brevibus, dense subtiliter strigosis, suturam versus late depressiusculis, disco carina crassa, ad humeros furcata, regione scutellari ovatim depressa, parte marginali dense subtiliter transversim rugosula, lobo humerali modice ampliato, sutura postice elevata; subtus lævis, abdomine medio denudato, lateribus guttis et strigis pallidis signato, pectoris lateribus pallido-squamosis, tibiis anticis modice tridentatis.* — Vallée du Tong-Hô, Thibet (coll. Oberthur).

Ressemble à *T. rufosquamosa* Fairm., du Tonkin, mais bien plus large, à longue villosité, avec le chaperon tronqué et un peu relevé, et les élytres plus courtes, moins fortement lobées aux épaules, à sculpture plus fine, non striolée en dehors, et n'ayant qu'une seule tache pâle. La troncature du chaperon est remarquable dans ce genre.

ZABROIDEUS n. g.

Corpus oblongo-ovatum, convexum, apterum. Caput sat parvum, sat verticale, clypeus truncatus, labrum integrum. Oculi minuti, angusti, leviter sinuati. Palpi maxillares articulo ultimo late triangulari. Antennæ sat graciles, prothoracis basin superantes, apicem versus vix sensim crassiores, articulis penultimis haud transversis, 3° ceteris longiore. Prothorax transversus, elytris vix angustior, antice et basi fere similiter parum angustatus, lateribus leviter arcuatis, marginatis. Scutellum sat magnum, triangulare. Elytra ovata, postice leviter ampliata, striolata.

Prosternum postice acute angulatum, mesosternum late obtuse oblique impressum. Pedes sat validi, femoribus inermibus, tarsis posterioribus articulo 1° ultimo longiore.

L'insecte qui sert de type à ce genre, a tout à fait le faciès d'un *Zabrus inflatus* ou plutôt d'un *Z. angustatus*. Il me paraît voisin des *Heliophygus* et *Misolampidius* dont il diffère par le corps moins convexe, le corselet large, l'écusson grand, le prosternum terminé en pointe aiguë, le mésosternum largement ouvert en angle obtus, mais peu profondément, et le 1er article des tarses postérieurs plus long que le dernier.

Z. pinguis. — Long. 15 mill. — *Ovato-oblongus, sat convexus, fuscus, nitidus; capite dense punctulato, inter antennas transversim impresso, epistomate rufo, membranaceo, labro lato, brevi, antennis mediocribus, prothoracis basin parum superantibus, apice haud incrassatis; prothorace fere lævi, margine postico recto, angulis obtusis; elytris ad humeros late rotundatis, apice obtusis, parum fortiter punctulato-striatis, striis externis minus impressis, intervaliis planis, subtiliter sat dense punctulatis; subtus lævis, abdomine strigoso, prosterno inter coxas late impresso.* — Se-Pin-Lou-Chan, Ya Tcheou, Thibet (coll. Oberthur).

Pyrochroa insignita. — Long. 19 mill. — *Sat elongata, parum convexa, nigra, sat nitida, elytris coccineis, subopacis; capite fere triangulari, basi valde constricto, angulis basalibus conicis, exsertis, fronte inter oculos transversim elevata, polita, clypeo transversim impresso, oculis reniformibus, antennis sat validis, elytrorum tertiam partem attingentibus, valde pectinatis, articulo 3° late triangulari, prothorace transverso elytris angustiore, postice angustato, lateribus ante baasin sat angulatis, angulis anticis rotundatim angulatis, dorso medio sulcato, utrinque foveola minuta, basi callis 2 minutis politis signato, margine antico medio sat fortiter rotundato; scutello truncato; elytris elongatis, apice rotundatis et leviter dehiscentibus, utrinque costis 3 sat elevatis, sutura paulo elevata, intervallis subtiliter alutaceis; pedibus validis.* — Se-Pin-Lou-Chan, Thibet (coll. Oberthur).

Ce bel insecte a un faciès assez différent des autres *Pyrochroa* à raison des côtes des élytres, mais je ne vois aucun caractère important pour le séparer. La saillie des angles de la tête et du corselet ne sont que l'exagération de ce qui existe chez la *P. coccinea*. Mais le faciès donne l'idée du *Macrolycus Bowringi*, de la même région.

Chlorophila obscuripennis. — Long. 17 mill. — *Elongata, modice convexa, capite, prothorace pectoreque viridi-metallicis, valde nitidis, elytris olivaceis, sericeo-opaculis, ad humeros*

ænescentibus et nitidulis, margine externo pallido anguste limbatis, abdomine pedibusque pallide testaceis, genubus et tarsorum articulis apice breviter infuscatis, antennis minus dilute testaceis; capite valde rugoso, clypeo convexo, lævi, labro metallico, convexo, lævi, palpis obscure testaceis, apice infuscatis; antennis sat gracilibus, medium corporis haud attingentibus, apicem versus haud crassioribus, articulo ultimo tribus præcedentibus conjunctis longiore; prothorace ovato, capite vix latiore, elytris dimidio angustiore, latitudine paulo longiore, antice vix attenuato, dorso sat subtiliter dense transversim strigosulo, basi utrinque foveola angusta, strigiformi, sat profunda impresso; scutello obtuso, metallico; elytris elongatis, ad humeros angulatim rotundatis, apice tantum angustatis, dorso leviter punctulato-striatulis, intervallis subtilissime coriaceis. alternatim paulo convexiusculis; subtus punctulata, abdomine metallico-micante, lateribus fusco-maculoso. — Vallée du Tong-Hô, Thibet (coll. Oberthur).

Cet insecte intéressant appartient au genre *Chlorophila* Sémén. (Hor. Ent. Ross. XXV, 374) que son auteur considère trop modestement comme sous-genre des *Lagria*, mais qui en diffère notablement, d'abord par la longueur du corps qui n'est nullement élargi en arrière, les antennes allongées ne grossissant pas vers l'extrémité, à articles allongés, le 3ᵉ au moins égal au 4ᵉ, les épipleures étroites, les pattes plus longues; le dernier article des palpes maxillaires est plus obliquement tronqué.

La *C. Portschinskyii*, type du genre, paraît bien voisine de notre espèce; mais elle est un peu moins grande et est, en-dessus, d'un vert gai avec les élytres mates, la suture étroitement dorée et le dessous du corps testacé, à reflets d'un vert bronzé. La description, très détaillée, ne parle pas des deux impressions basales du corselet et l'indique comme fortement strigueux.

C. campestris — Long. 12 mill. — Forme de la précédente, mais plus petite, plus étroite, et entièrement d'un vert gai, presque mat sur les élytres, un peu moins sur la tête et le corselet, avec les antennes, sauf le 1ᵉʳ article, la base et le dessous des fémurs avec les hanches d'un fauve roussâtre. La tête et le corselet sont couverts de fines rugosités serrées; ce dernier atténué en avant présente une strie longitudinale très fine et est légèrement impressionné le long du bord postérieur; le dessous du corps est très finement ruguleux. — Se-Pin-Lou-Chan, Ya-Tcheou, Thibet (coll. Oberthur).

Cet insecte ressemble à la *Lagria pretiosa* Reiche, mais les antennes et les palpes sont trop différents pour qu'on puisse les réunir dans le même genre.

PSEUDABRIS n. g.

L'insecte qui sert de type à ce nouveau genre présente un faciès participant des *Mylabris* et des *Meloe*. Il rappelle un peu ces derniers par les élytres que l'abdomen dépasse et dont la suture est un peu déhiscente à l'extrémité, mais il se rapproche surtout des *Mylabris* par la disposition des hanches et les élytres à bandes transversales. Il s'en distingue par la tête plus triangulaire, les yeux plus petits, plus distants de la base, les antennes de grosseur égale ne grossissant pas visiblement vers l'extrémité, à 2e article très court, le 3e bien plus allongé, les suivants subégaux, le dernier un peu plus long, pas plus gros, acuminé; le corselet est bien plus court, les côtés angulés en avant; l'écusson est assez large, obtus; les élytres un peu allongées, s'élargissent avant l'extrémité qui est arrondie et déhiscente et ne recouvrent pas d'ailes; le métasternum est plus court, les pattes sont semblables. Les palpes maxillaires sont plus robustes, le dernier article plus tronqué.

P. tigriodera. — Long. 13 à 21 mill. — *Sat elongata, convexa, nigra, nitida, elytris rubris, punctato-rugosis, transversim nigro trifasciatis, fascia 1a ante medium valde interrupta, 2a mediana, integra, paulo dentata, 3a magna, apicali, maculam rubram includente, his fasciis per marginem externum anguste marginatis, punctis aliquot nigris interjectis; pedibus sat magnis.* — Pa-Tsé-Fang, Mœnia, Thibet (coll. Oberthur).

Les parties rouges et noires sont très nettement limitées et ces dernières paraissent un peu plus élevées.

Chez les ♀ les élytres sont un peu plus déhiscentes et l'abdomen est un peu plus découvert.

Attelabus longicollis. — Long. 10 mill., rostr. incl. — *Oblongus, convexus, cyaneus, valde nitidus, antennis fuscis; capite elongato, cum rostro prothorace plus duplo longiore, bicarinato, carinis ante oculos coeuntibus, antennis elongatis, prothoracis basin superantibus; prothorace brevi, antice valde angustato, basi marginato et transversim sulcato, disco lævi, lateribus impresso, pleuris fortiter sulcatis, plicatis, prosterno antice similiter plicato; scutello subquadrato; elytris breviter ovatis, ad humeros angulatis, ante medium transversim fortiter impressis, grosse lineato-punctatis, lineis marginalibus sulcatulis, punctis post medium obliteratis, sutura basi utrinque sulco brevi profundo comitata; pectore lateribus valde rugoso, abdomine vix punctulato, pedibus anticis magnis, femoribus valde inflatis, tibiis arcuatis, sulcatis, intus acute denticulatis.* — Pa-Tsé-Fang, Thibet (coll. Oberthur), Kiukiang (ma collection).

Ressemble beaucoup au *cœruleus* Jekel, mais bien plus grand, avec la tête beaucoup plus longue et le prothorax fortement plissé sur les flancs et en-dessous au lieu d'être simplement rugueux ; les élytres sont aussi moins courtes, moins carrées, atténuées en arrière et non brusquement arrondies.

CASIPHIA n. g.

Ce nouveau genre me semble bien appartenir à la cohorte des vrais Pœcilosomes de Lacordaire ; il rappelle, par le faciès, les *Pœcilosoma* d'Amérique, mais il en diffère au point de servir de type à un nouveau groupe fort intéressant au point de vue de la distribution géographique et de la conformation des antennes.

Les yeux sont finement granuleux, les mandibules sont courtes, verticales, les fémurs postérieurs n'atteignent pas l'extrémité des élytres. Mais la saillie intercoxale est large et obtuse, les antennes n'atteignent pas tout à fait le milieu du corps et sont composées de huit articles seulement, le 3ᵉ très long, aussi long que les 3 suivants réunis, les 4-7 angulés, le 8ᵉ bien plus épais, presque aussi long que les 3 précédents réunis. Le corselet très court, plus étroit que les élytres, se rétrécit de la base en avant en ligne droite, sans angulation ; l'écusson est très large; les élytres, oblongues, sont arrondies ensemble à l'extrémité. La saillie prosternale est large, presque tronquée à l'extrémité qui s'appuie simplement sur le mésosternum et dépassant un peu les hanches antérieures. Les pattes sont fortes, les tibias très comprimés.

N'ayant vu qu'une ♀ je ne saurais dire si le ♂ ne présente pas de différences ; il est probable qu'il doit exister quelque modification dans le dernier article des antennes qui ressemble à celui des *Masaris*.

C. thibeticola. — Long. 24 mill. — *Oblonga, modice convexa, fusca, parum nitida, elytris fusco-æneis, magis nitidis; capite sat dense grosse punctato, inter oculos late impresso et longitudinaliter sulcato; prothorace fere trapezoidali, margine antico recto, ante angulos leviter sinuato, margine postico late arcuato, ante angulos leviter obliquato, his productis sed apice obtusis, dorso subtiliter sat dense punctato, basi subtiliter marginato, ad latera sat late leviter impresso; scutello grosse punctato; elytris oblongis, postice vix sensim attenuatis; dorso dense ac grosse carioso punctatis, humeris intus lobato-productis; pectore parum fortiter punctato; abdomine laxe punctulato, lateribus oblique impresso.* — Se-Pin-Lou-Chan, Ya Tchéou, Thibet (coll. Oberthur).

Stenura stricticollis Fairm., Ann. Ent. Fr. 1889, 62. — Cette espèce paraît assez variable de coloration. Chez deux individus provenant du Thibet les antennes ont la base des articles 3 ou 4-8

pàles, les 3 derniers sont pâles avec l'extrémité du 11e brune ; les élytres sont d'un roussâtre obscur avec les bords latéraux brunâtres, cette couleur formant plus ou moins des macules mal limitées ; l'abdomen est brun, à pubescence grisâtre ; les quatre fémurs postérieurs sont fauves à la base. Chez tous les individus le corselet présente un faible sillon médian, les impressions de la base sont transversales. La ♀ est plus grande (13 mill.), plus épaisse avec les antennes plus courtes.

ACANTHOPTURA n. g.

Tête carrée, brusquement rétrécie en arrière des yeux. Antennes assez robustes et assez écartées, 3e article à peine plus long que le 4e. Yeux finement granulés, presque entiers. Corselet transversal, brusquement rétréci en avant, presque bilobé en-dessus. Éperons postérieurs fins, de grandeur médiocre, tarses postérieurs à 1er article plus long que les 2 suivants réunis. Hanches antérieures très saillantes, dépassant la saillie prosternale, la mésosternale inclinée en avant. Hanches postérieures écartées. Élytres fortement épineuses à l'extrémité.

Genre tenant à la fois aux *Stenocorus* et aux *Brachyta*, bien distinct par ses élytres épineuses à l'extrémité, son corselet brusquement rétréci en avant avec 2 fossettes sur le disque, la tête courte, brusquement rétrécie en un col court et la saillie intercoxale large, obtuse, les hanches postérieures étant écartées.

A. spinipennis. — Long. 14 à 16 mill. — *Fusca, sat nitida, griseo-pubescens, elytris rufo-testaceis, flavo-maculatis, utrinque post basin maculis 2 rotundatis, macula magna media-externa, postice cum majore conjuncta, hac cum macula apicali extus conjuncta ; capite ante oculos transversim sulcato, inter antennas leviter concavo, antennis elytrorum apicem haud attingentibus, articulo 4° tertio et quinto paulo breviore ; prothorace elytris angustiore, vix transverso, antice collari-constricto et transversim fortiter impresso, dense subtiliter rugosulo, medio sulcatulo, utrinque fovea rotunda sat profunda impresso, basi transversim impresso ; scutello triangulari ; elytris ad humeros rotundatim angulatis, a basi gradatim attenuatis, subtilissime densissime punctulatis, apice paulo oblique sinuatis et utrinque bispinosis, spina externa longiore ; tarsis sat latis.* — Pa-Tsé-Fang, Thibet (coll. Oberthur).

Ressemble assez à nos *Brachyta*, mais la tête, le corselet et l'extrémité des élytres sont fort différents.

Je regarde comme la ♀ de cette espèce un individu de 16 mill., plus grand, plus robuste, avec les élytres plus amples n'ayant pas

les macules antémédianes, mais ayant les taches médianes bien détachées l'une de l'autre ainsi que les avant-dernières et ne se rejoignant pas par le bord externe; le corselet est assez différent, fortement convexe en travers avec de faibles traces des deux impressions dorsales et profondément sillonné en travers à la base, le bord postérieur étant fortement relevé avec les angles pointus et saillants en dehors. Les antennes ne dépassent pas le milieu du corps. — Vallée du Tong-Hô, Thibet (coll. Oberthur).

COLOBASPIS n. g.

Labrum integrum, antice dense pilosum. Antennæ articulis 4-10 crassioribus, vix subserratis. Prothorax marginibus basali apicalique fortius elevatis, lateribus ante basin dente sat valido armatus. Scutellum recte truncatum. Metasternum planiusculum. Femora postica ante apicem dente longo et acuto armata, tibiæ fortiter curvata.

Ce genre est évidemment très proche voisin du genre *Clythraxeloma* Kraatz, mais il présente des différences assez notables pour motiver sa création. Le corselet est muni de chaque côté, d'une assez forte dent, tandis qu'il est inerme chez les *Temnaspis* et les *Clythraxeloma*. Il est en outre plus court avec les bords antérieur et postérieur plus fortement relevés. Le labre est entier et l'écusson est nettement tronqué. Enfin la tête est plus grosse, avec les yeux plus gros et plus saillants.

C. flavonigra. — Long. 13 mill. — *Oblonga, convexa, nigra, nitida, elytris flavidis, utrinque vitta lata externa nigra, ab humero incipiente, medio intus dilatata, post medium oblique abbreviata, margine externo basi anguste flavo; capite basi punctato, inter oculos fovea signato, clypeo a fronte sulco transverso separato, antennis sat brevibus, sat crassis, basi gracilioribus; prothorace transverso, antice parum angustiore, basi et antice fortiter tranversim impresso, disco lævi, fere bilobo, margine postico medio truncato, utrinque fortiter sinuato, lateribus post basin dente valido, obtuso armatis; scutello fere lævi, recte truncato; elytris ad humeros lobatis, oblique truncatis, apice rotundatis, dorso modice punctatis, punctis basi paulo asperulis, nigrosetosulis; subtus fere lævis, abdomine parce punctato, flavo anguste circumducto, femoribus posticis annulo anteapicali flavo ornatis; ♂ femoribus posticis valde inflatis, capite summo simplici; ♀ femoribus parum inflatis, similiter armatis, capite summo convexo.* — Mœnia, Thibet (coll. Oberthur).